

المستخدم في اللقاح يتعرض للزوال في غضون ساعات أو أيام كأقصى حد mRNA لا تغير من الجينات. ال mRNA لقاحات

لا ضير من استخدام مسكن للألام وخافض للحرارة بعد التطعيم إذا لزم الأمر

أو اللقاحات المعطلة. لا داعي لتناول مسيلات الدم أو الأسبرين mRNA لا توجد تقارير عن تجلط الدم (الجلطة) بعد لقاحات

لمنع التخثر المزعوم بسبب اللقاح. أما إذا كنتم تستخدمونه بسبب مرض آخر، فيجب الاستمرار في استخدامه

لا ضير من الاستحمام أو السباحة في البحر بعد التطعيم

من المعروف أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى أمراض شديدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل التدخين من فعالية الحماية التي يوفرها

اللقاح. ومع ذلك، فإن هذا الوضع سار على مدى 20 دقيقة بعد التدخين فقط

إيجابياً PCR "" التطعيم لا يجعل اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل

✓ يجب تطعيم المصابين بأمراض الروماتيزم والسرطان والجهاز المناعي والأمراض العصبية

✓ يجب عدم التوقف عن تناول أي دواء يستخدم للأمراض الموجودة قبل التطعيم أو بعده

✓ الوضع الوحيد الذي يمنع التطعيم هو نوع الحساسية المفاجئ الذي يظهر في غضون دقائق بعد الجرعة الأولى من

أي لقاح ويتطلب تدخلاً طبياً

التطعيم لحمايتكم وحماية أحبائكم

الطريقة الأكثر أماناً وفعالية والأقل تكلفة

!إذا كنتم تريدون العيش والبقاء على قيد الحياة، فلا تقلقوا، بل بادروا لتلقي اللقاح

والأسئلة الشائعة COVID-19 لمزيد من المعلومات: لقاحات

https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=6dc46898-d802-11eb-9450-8a9f7b8c4cda

كعاملين في القطاع الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والجمعية الطبية التركية

قمنا على الدوام وبلا تردد بتزويدكم بالحقائق العلمية المتعلقة بحقوق الحياة والصحة والسلامة العامة، ونواصل ذلك. إننا نثق

بالعلم والعلماء في مجال الصحة العامة. في ظل الظروف الحالية، يعد اللقاح الأداة الأكثر فاعلية في مكافحة جائحة كوفيد-19. تم

تحديد العتبة اللازمة لتجاوز خطورة الوباء في تركيا عبر تطعيم 85% على الأقل من السكان. بمعنى آخر، بالنسبة لتركيا، يجب

تطعيم ما لا يقل عن 75 مليون شخص بجرعة مضاعفة. سنحاول إطلاعكم على المعلومات التي بحوذتنا حول التطعيم استناداً

على المسؤولية التي يحتملها لنا المجتمع والعاملين في مجال الصحة

"نحن نثق باللقاح، لذا عليكم الوثوق به أيضاً. "لا تقلقوا، بل بادروا لتلقي اللقاح"

أياً من لقاحات كوفيد 19- الحاصلة على موافقة أبحاث ودراسات "فاز 3" العالمية لا تحمل الفيروس بحد ذاته. "اللقاحات

المعطلة" تحتوي على "الفيروس المعطل" (الذي بهدت قدرته على إحداث المرض)، بينما يتم في اللقاحات الأخرى استخدام البروتين

السطحي المستهدف للفيروس لتحفيز المناعة. بمعنى آخر، لن يتم نقل فيروس المرض إليكم عن طريق اللقاح

كما هو الحال بالنسبة لجميع اللقاحات، فإن لهذه اللقاحات آثاراً جانبية أيضاً. الأثر الجانبي الأكثر شيوعاً هو ألم قصير المدة في

الذراع (لا يتجاوز يوم أو يومين). لم يلاحظ أي آثار جانبية مقلقة في هذه اللقاحات، التي تم إعطاؤها لأكثر من ملياري ونصف

المليار شخص. في حين، يمكن أن تصل الآثار الجانبية عند إصابتكم بجائحة كوفيد إلى مستوى يهدد حياتكم

الآثار الجانبية المرتبطة باللقاحات ليست مهددة للحياة ويمكن التحكم بها. فرط الحساسية أقل من 1%. بينما المرض يحمل

مخاطر أكبر من هذه الآثار الجانبية ويهدد الحياة

فإنها لا تؤثر أيضاً في الحصول على لقاحات كوفيد "mRNA" كما أن الإصابة بالحساسية لا تمنعكم من الحصول على لقاحات

الأخرى

صغر سنكم لا يحميكم من المرض وعواقبه. يجب إعطاء اللقاح لجميع الفئات العمرية التي تمت الموافقة عليها

يمكن أخذ اللقاحات منذ بداية الحمل. ومع ذلك، نظراً لأن الفترة الأولى من الحمل هي الفترة التي تكون فيها عمليات

الإجهاض التلقائي أكثر شيوعاً، يمكن انتظار الأسابيع من 12 - 16 الأولى حتى لا يتم ربط الإجهاض بالتطعيم. التطعيم مهم جداً

وخاصة في الثلث الثالث من الحمل

لا بأس من التطعيم أثناء الرضاعة الطبيعية. ويمكن الاستمرار في الرضاعة الطبيعية بعد الحصول على اللقاح

اللقاحات لا تسبب العقم، بل كشفت دراسة عن بعض من الآثار الإيجابية للتطعيم على جودة السائل المنوي لدى الرجال



TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
EMEKLİLERİ SENDİKASI

